

## **Recommandations du Comité Scientifique régional Covid-19 pour améliorer la portée épidémiologique et préventive de la campagne de dépistage réalisée dans la Région AuRA**

Avis préparé par :

Pr Elisabeth Botelho-Nevers, Pr Jean Beytout, Pr Olivier Epaulard, Pr Bruno Lina, Pr Philippe Vanhems

Cet avis a été transmis aux autorités régionales AuRA le 18 décembre 2020 à 12h.

### **Contexte**

Un dépistage massif du SARSCov2 dans la population générale de la région AuRA va être proposé du 17/12/2020 au 24/12/2020. L'objectif de ce dépistage est la détection de cas positifs (notamment asymptomatiques) à des fins épidémiologiques (renforcement de la surveillance virologique) et de prévention (par une information robuste et détaillée décrivant les mesures individuelles à prendre afin de contrôler la transmission du virus). Il s'agira de mieux préparer la période de Noël en donnant à la population l'ensemble des outils et moyens permettant de prévenir le risque de transmission dans un contexte familial lié aux fêtes et repas de Noël, et plus largement, lors de toutes interactions entre personnes (contextes professionnels, transports, associatifs, festifs, etc) préalablement à cette période à risque.

La finalité est de mettre en œuvre un programme de prévention performant, basé sur le recueil détaillé et la disponibilité de données épidémiologiques et virologiques pour le grand public, en combinant cette information à de l'éducation sanitaire.

### **Recommandations**

Dans le cadre de cette démarche le CS souligne l'importance de s'appuyer sur les points suivants :

1. Le recueil et l'analyse des données ainsi que l'évaluation du dispositif devront se faire en partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs, notamment l'ARS et les CIRE de la région AURA.
2. La remontée des résultats des tests ainsi que les premières analyses de données populationnelles devront être rapides (indicateurs en temps réel) afin de pouvoir suivre les taux de positivité en fonction des lieux et personnes testées, et de cartographier les zones à forte circulation virale (en complément des données générées par l'ARS). Un suivi puis un bilan des performances des lieux de dépistage seront nécessaires. La synthèse et l'interprétation de ces données permettront d'éclairer sur la dynamique évolutive de l'épidémie et de déterminer quand et où ces dépistages devront être répétés. L'identification de populations et de territoires à forte positivité pourrait nécessiter le renouvellement rapide de cette stratégie de dépistage combinée à des interventions préventives ciblées.
3. Le dépistage devra être associé à des informations sur le virus et la prévention de sa transmission. Par ailleurs, un questionnaire anonyme sur la perception du risque de transmission et sur les vaccins devrait être proposé. Sans perturber la fluidité de la réalisation des tests, le questionnaire (ci-joint) serait à faire remplir par une partie des personnes testées

par les Tests Rapides (tests antigéniques). Ce questionnaire est totalement anonyme, et devrait dans la mesure du possible comporter le résultat du test rapide réalisé.

4. Un point de mesure unique durant la période du 17 au 24 est utile d'un point de vue individuel et instantané pour la gestion de la période des fêtes de Noël, mais ne sera pas utile pour réduire une éventuelle dynamique épidémique à moyen terme (fin décembre et début janvier) Cette maîtrise nécessite de répéter l'ensemble de ces actions de dépistage et d'information, et cette répétition est donc à encourager.

**En conclusion,** Le CS insiste sur le fait que la pratique du dépistage doit s'accompagner d'informations adaptées sur les mesures de prévention en général, non seulement pour les cas détectés positifs, mais aussi et surtout pour les personnes détectées négatives. Il sera important de prévenir que ce résultat négatif ne doit PAS être considéré comme un blanc-seing permettant de se soustraire au respect des mesures barrières et des mesures d'hygiène. Les patients détectés positifs se verront fournir une information détaillée sur la conduite à tenir pour l'isolement, et des mesures d'accompagnement devront être proposées si nécessaire.

Ce dépistage prévu en décembre 2020 devra être renouvelé en fonction des critères de succès qui auront été identifiés après évaluation du dispositif, afin de lui permettre d'avoir un possible impact sur la dynamique épidémique, notamment dans les zones où une prévalence élevée aura été détectée.